

INFECCIONES OCULARES

BACILLUS CEREUS

- Panoftalmitis
- Ant. Cortada, traumatismo
- Drogadicto IV
- Factores de virulencia: Toxina necrótica
- Cereolisina y Fosfolipasa AC
- Px con RÁPIDA pérdida de la vista
- Bacilos Gram+ en muestra ocular



NEISSERIA GONORRHOEAE

Oftalmia neonatal gonocócica

- Px RN con secreción purulenta en el párpado
- Ant. Parto vaginal - Madre infectada
- Ophthalmia neonatorum
- Diplococos Gram -
- Cultivo en: Agar chocolate o Thayer-Martin




Igual Haemophilus

Cistina+Glucosa+CO2 al 5% a 35°

PSEUDOMONAS

- Ant. De traumatismo o uso de lentes
- De contacto (Microtraumatismos)
- Px inmunodeprimido
- Exotoxina A - PFV
- Globo ocular hiperémico, con secreción verdosa y presencia de pus en cámara anterior (Hipopión)
- Bacilos Gram -



CHLAMYDIA

Conjuntivitis NEONATAL - Dx diferencial con Gonorrea

Px RN con párpados hinchados con hiperemia y secreción purulenta

Ant. Parto vaginal y madre infectada

Patógeno intracelular, Microscopía negativa



CHLAMYDIA

- Tracoma
- Conjuntivitis folicular
- Ant. De promiscuidad, trabajador sexual
- Px con Ojo rojo, hiperémico, presencia de pus, lagrimeo, lagañas y retracción del párpado
- Serovariedades: A,B,Ba y c
- Complicación: Ceguera
- Patógeno intracelular
- Bacilos Gram -
- Inclusiones intracitoplasmáticas

